

**NẤM ĐỘC XANH ĐEN (AMANITA PHALLOIDES)**  
**(Kẻ giết người trong rừng)**

- > Mũ màu xanh đen nhạt, đường kính 6-12 cm.
- > Có bao gốc dạng đài hoa.
- > Có vòng nấm màu trắng ở trên cuống.



**NẤM ĐỘC TRẮNG (AMANITA Verna)**  
**(Nàng tiên giết người trong rừng)**

- > Mũ màu trắng đường kính từ 7 - 10 cm
- > Có bao gốc dạng đài hoa
- > Có vòng nấm màu trắng ở trên cuống



**NẤM ĐỘC ĐỎ (AMANITA MUSCARINA)**

- > Mũ màu đỏ da cam, đường kính từ 5-10 cm, phủ mụn màu trắng
- > Có bao gốc dạng vòng gờ do nhiều gờ mụn nhỏ xếp thành
- > Có vòng nấm màu trắng ở trên cuống



**NẤM ĐỘC NÂU  
(AMANITA PANTHERINA)**

- > Mũ màu nâu nhạt, đường kính từ 5-10 cm, phủ các vẩy mụn màu trắng
- > Có bao gốc dạng gờ nhiều vòng điển hình
- > Có vòng nấm màu trắng ở trên cuống



**NẤM PHIẾN ĐEN CHÂN VÀNG  
(AGARICUS XANTHODERMUS)**

- > Mũ nấm dạng bán cầu dẹt, màu trắng đục như vôi, đường kính từ 5-15cm
- > Phiến nấm ở mặt dưới, khi non màu trắng rồi chuyển sang màu hồng và khi già có màu đen.
- > Cuống nấm hình trụ, màu trắng giống như mũ nấm
- > Phần gốc khi bẻ ra chuyển thành màu vàng nâu. Trên cuống có vòng nấm dày màu trắng, có sắc thái vàng ở mũ.

**NẤM MŨ KHÍA (INOCYBE PATOUILLARDII)**

- > Mũ nấm dạng nón, dẹt, có khía từ đỉnh xuống mũ đường kính từ 3.5-8 cm
- > Có sắc thái nâu đỏ
- > Phiến nấm có sắc thái nâu đỏ tương tự mũ nấm
- > Cuống có sắc thái nâu đỏ, thịt nấm dạng sợi khi tách ra.



- 1. CHỈ HAI NẤM BIẾT CHẮC CHẮN LÀ ĂN ĐƯỢC.**
- 2. TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĂN NẤM LẠ.**
- 3. KHÔNG ĂN THỦ NẤM, DỨT KHOÁT LOẠI BỎ NẤM KHI CÒN NGHÌ NGỜ.**
- 4. KHÔNG ĂN NẤM ĐÃ GIÀ HOẶC NẤM BỊ ÔI THIU.**
- 5. SƠ CỨU NGAY KHI CÓ TRIỆU CHỨNG NGỘ ĐỘC, RỒI CHUYỂN ĐI CẤP CỨU Ở TRUNG TÂM Y TẾ GẦN NHẤT.**